

INFORMACJA DLA PACJENTÓW PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

Szanowni Państwo.

**Prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń mających ułatwić
Państwu przygotowanie się do badania.**

Zakład Radiologii - ul. Przybyszewskiego 49, ul. Grunwaldzka 16/18, ul. Grunwaldzka 55

Badanie obrazowe jelita grubego (rentgenowskie i TK)

- dwa dni przed badaniem - dieta półpłynna;
- dzień przed badaniem - dieta półpłynna oraz rano należy wypić lek przeczyszczający, np. Fortrans (1 saszetkę rozpuścić w 1 litrze wody i wypić w przeciągu 3 godzin)
- w dniu badania na czczo (nie jeść i nie pić) oraz rano wykonać doodbytniczy wlew czyszczący; leki zalecone przez lekarza należy zażyć jak co dnia (popijając jedynie niewielką ilością wody).

Przygotowanie do rentgenowskiego badania kontrastowego górnego odcinka przewodu pokarmowego i pasażu górnego odcinka przewodu pokarmowego

- w dniu badania nie jeść i nie pić
- w dniu badania leki przyjmowane na stałe zażyć dopiero po badaniu

Przygotowanie do zdjęć przeglądowych kręgosłupa odcinka lędźwiowego

- w dniu badania nie jeść i nie pić
- w dniu badania leki przyjmowane na stałe zażyć jak dotychczas (popić niewielką ilością wody)
- przez kilka dnia przed badaniem zażywać Espumisan

Przygotowanie do badania MR miednicy

- Leki pobierane na stałe według zalecenia lekarza

Przygotowanie do badania MR jamy brzusznej

- Leki pobierane na stałe według zalecenia lekarza

Przygotowanie do badania Enterografii MR

- Dwa dni przed terminem badania dieta lekkostrawna, unikać pokarmów pieczonych, wzdymających i z nasionami.
- W dniu poprzedzającym badanie rano można zjeść niezbyt obfite śniadanie. Później należy przyjmować tylko płyny: gorzka herbata, woda mineralna niegazowana, kawa gorzka bez mleka. Nie jeść stałych pokarmów.
- O około godz. 15.00 należy zacząć picie płynu przeczyszczającego o nazwie FORTRANS lub zamiennik – preparat dostępny jest w aptece na receptę. FORTRANS lub zamiennik rozpuszczamy: 1 saszetka na 1 l wody. Jedna saszetka przypada na 20 kg masy ciała np. 60 kg – 3 saszetki, 80 kg – 4 saszetki itd.

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII

- Płyn należy wypić w przeciągu 2,5 – 3 godzin. W razie potrzeby smak Fortransu można zmienić dodając cytrynę.
- Preparatu nie mogą przyjmować osoby z niedrożnością jelit oraz z objawami ostrego brzucha.
- Dzieci i pacjenci z niedowagą – należy omówić przygotowanie z lekarzem kierującym na badanie.
- W dniu badania na czczo.
- Leki pobierane na stałe zgodnie z zaleceniem lekarza popić wodą mineralną niegazowaną (kilka łyków).
- Zgłosić się do pracowni 1,5 godz. przed badaniem.

Sposób przygotowania do badania MRCP (cholangiografia MR)

- 5 - 6 godzin przed badaniem nie jeść i nie pić
- Leki pobierane na stałe według zalecenia lekarza – można popić niewielką ilością

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY PAŃSTWU SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA