

**INFORMACJA DLA CHORYCH
SCYNTYGRAFIA CAŁEGO CIAŁA**

NAJWAŻNIEJSZE ZALECENIA OGÓLNE

1. Przez 5 – 7 dni przed badaniem wskazane codzienne stosowanie wieczorem herbaty przeczyszczającej (np. Figura 1 lub Figura 2 lub podobnej) oraz picie zwiększonej ilości płynów – ok. 2 litry / dobę.
2. Dzień przed badaniem wieczorem – zastosowanie środka przeczyszczającego w postaci tabletki lub czopka (np. Alax, Bisacodyl).
3. Rano przed badaniem – kąpiel i zmiana bielizny osobistej.
4. 30 – 60 min przed badaniem – wypicie ok. pół litra wody, mleka lub lekkiej herbaty.
5. Tuż przed badaniem dokładne opróżnienie pęcherza ze skrupulatnym zachowaniem zasad higieny i mycia rąk.
6. Przez ok. 7 dni po badaniu nadal wskazane codzienne stosowanie wieczorem herbatyprzeczyszczającej oraz picie płynów (nie mniej niż 2 litry / dobę).

LECZENIE 131-1

1. Skrupulatne przestrzeganie higieny i mycie rąk przed wyjściem z toalety
2. Od podania izotopu konieczne jest obfite picie płynów (nie mniej niż 2 litry / dobę); jeśli nie ma przeciwwskazań - korzystne jest dodawanie do wody soku z cytryny, ssanie kwaśnych cukierków, żucie gumy.
3. Przez około 7 – 10 dni po leczeniu nadal wskazane codzienne stosowanie herbaty przeczyszczającej.
4. Ograniczyć kontakt :
 - a. z dziećmi do lat 2 oraz kobietami ciężarnymi przez okres
 - b. z dziećmi powyżej 2 roku życia przez okres
5. Spać w osobnym pomieszczeniu na osobnym pościu przez okres
6. Unikać przebywania w miejscach zgromadzeń do

Rozpoczęcie pobierania preparatów tyroksyny (EUTHYROX, LETROX, ELROXIN)
oraz stosowanie innych leków po uprzednim skonsultowaniu z lekarzem prowadzącym.

Podpis lekarza.....

