

Pozyskiwanie moczu do badania ogólnego

1. Przygotowanie pacjenta do badania:
 - W dniu poprzedzającym badanie pacjent powinien przed udaniem się na spoczynek nocny całkowicie opróżnić pęcherz moczowy.
 - Do badania ogólnego pozyskuje się mocz z pierwszej porannej mikcji.
2. Po przebudzeniu i po porannej toalecie, pacjent powinien oddać mocz do plastikowego jednorazowego naczynia w ilości 30 – 100 ml, opisanego danymi pacjenta (imię i nazwisko, oddział szpitalny /zleceńodawca, PESEL/ lub nr identyfikacyjny pacjenta). Pozyskany mocz musi pochodzić ze środkowego strumienia. Pojemnik z moczem należy szczelnie zamknąć. Mocz przeznaczony na badanie ogólne należy jak najszybciej transportować do laboratorium. Badanie musi być wykonane w ciągu 2 godzin od momentu pozyskania moczu, ponieważ po tym czasie zmienia się skład elementów morfotycznych w moczu.

Uwagi

1. W szczególnych przypadkach, gdy pacjent ma trudności z oddaniem moczu minimalna ilość moczu pozwalająca wykonać badanie wynosi – 10 ml.
2. Dopuszcza się pozyskiwanie moczu w ciągu dnia. Fakt ten należy zaznaczyć na zleceniu na badanie ogólne moczu.
3. Opis próbki moczu musi być umieszczony na pojemniku a nie na wieczku pojemnika!